


Fourrages conservés et sous-produits utilisés dans l'alimentation des bovins

région du
Vakinankaratra
(1 200 - 1 500 m altitude)

1. Calendrier d'utilisation des ressources



Fourrages conservés et sous-produits utilisés dans l'alimentation des bovins

région du
Vakinankaratra
(1 200 - 1 500 m altitude)

2. Valeurs nutritives des ressources

Ressource	MATIERE SECHE (%)			ENERGIE (UFL/kg MS)			PROTEINE (g MAD/kg MS)			
	min.	MOY.	max.	min.	MOY.	max.	min.	MOY.	max.	
Feuille de chou	6,6	7,9	10,7	0,78	0,94	0,99	87	103	121	
Feuilles et tiges	haricot	75,7	84,6	93,5	0,71	0,72	0,74	65	75	86
	maïs	27,1	36,9	54,4	0,57	0,68	0,81	66	79	92
	patate douce	12,3	18,2	32,4	0,63	0,77	0,90	41	80	122
	petit pois					0,67			88	
	pomme de terre					0,69			103	
	tomate	45,6	48,2	50,9	0,74	0,80	0,86	86	106	124
Paille de riz fraîche	37,7	41,3	45,0	0,53	0,55	0,57	29	33	37	
Fanes de maïs	93,7	94,6	95,2	0,45	0,48	0,49	24	31	45	
Foin de brachiaria	84,4	84,8	87,1	0,50	0,69	0,73	38	63	78	
Paille	blé	94,6	95,0	95,8	0,36	0,43	0,53	22,5	38	65
	orge	93,2	94,6	95,6	0,40	0,59	1,00	23	40	76
	riz	66,9	88,5	94,2	0,25	0,50	0,82	23	42	118
Carotte *	7,8	8,9	10,2	0,83	0,94	1,01	74	87	96	
Drèche de brasserie *	27,4	27,9	29,0	1,14	1,16	1,18	226	238	256	
Manioc *	37,8	41,4	61,5	1,13	1,14	1,16	36	50	64	
Patate douce *	31,4	36,2	51,8	1,12	1,14	1,15	46	56	74	
Son de riz	83,1	84,0	84,8	1,10	1,12	1,13	106	121	132	
Taro *	24,9	27,6	30,3	1,09	1,11	1,13	132	152	160	

* ne pas dépasser 15 % manioc et patate douce, 20 % drèche de brasserie et taro, 60 % carotte, de la ration fourragère journalière (en matière fraîche)